

50. ODONTIA.

Effusa superne echinata, pileo obliterato.

O. ferruginea, tomentosa ferruginea. (Passim ad truncos putridos.)

O. nivea, late effusa alba, margine byssino tubulis confertis brevibus integris. tab. 4. fig. 6. 7. (Passim intra trunc. putr.)

D. Hymenio papilloso.

51. STEREUM.

Pileo coriaceo dimidiato manifesto ut plurimum fasciato. (Thælæphora hirsuta; mesenteriformis Willd. Th. striata; variegata Schrader.)

St. purpureum, imbricatum subgelatinosum tomentosum albidum, subtus purpureum. (Prov. ut plurimum ad trunc. Popul. Tremulæ.)

St. nitidum, pileo imbricato pallido-griseo substriato nitido; subtus cinereo-pallido. (In pinetis ad truncos.)

St. rugosum, pileo duro flexuoso, rugoso fusco, subtus cinereo-pallido. (Ad trunc. fag., quercus.)

52. CORTICIUM.

Pileo obliterato, hymenio effuso resupinato toto adnexo.

C. polygonium, incarnatum; papillis majusculis polygoniis. (In ram. Pop. trem.)

C. læve, alutaceo carneum, late effusum, lævissimum, margine byssino. *Thælæphora papyracea Schrader in Linn. Syft. nat. ed. Gmelin. 1441.*

Obs. Juvenilis quidem orbiculata & papilla sæpe unica instructa, in adultis vero speciminibus superficies tota lævis est & papillæ evanescent.

Prov. ad trunc. popul. trem. hyeme, tota lævis.